

Monsieur
 Thomas Ortlieb
 rte du Tirage 16

1806 St-Légier

Kehrsatz, den 29. Juli 2015

RAPPORT

Miel de Monts de Corsier, récolté le 14.7.2015, L1215 (Probeneingang: 21.7.2015)

(Methode: Harmonized methods of melissopalynology. Apidologie 35. 2004)

Pollen dominant

(>45%) Fabaceae *Schmetterlingsblütler, fabacées*
 Trifolium repens *Weissklee, trèfle rampant*

Pollens d'accompagnement

(16-45%) Rosaceae *Rosengewächse, rosacées*
 Rubus *Himbeere/Brombeere, framboisier/ronce*

Pollens isolés

(3-15%) Castanea sativa (ü.r.) *Edelkastanie, châtaignier***

Pollens isolés moins important

(<3%)
 Apiaceae *Doldenblütler, apiacées*
 Heracleum-Typ *Bärenklauform, forme de berce des prés*
 Asteraceae-S. *Korbblütler der Distelform, asteracées de forme de cirse*
 Asteraceae-T. *Korbblütler der Löwenzahnform, asteracées de forme de dent-de-lion*
 Brassicaceae *Kreuzblütler, crucifères*
 Brassica *Raps, colza*
 Fabaceae *Schmetterlingsblütler, fabacées*
 Lotus *Hornklee, lotier*
 Trifolium pratense *Rotklee, trèfle rouge*
 Labiatae-M. *Lippenblütler der Majoranaform, labiées de forme de marjolaine*
 Ligustrum *Liguster, troène vulgaire*
 Liliaceae *Liliengewächse, liliacées*
 Allium *Bärlauch, ail des ours*
 Myosotis (ü.r.) *Vergissmeinnicht, myosotis ***
 Ranunculaceae *Hahnenfussgewächse, renonculycées*
 Ranunculus-Typ *Hahnenfussform, forme de renoncule*
 Reseda *Reseda, réséda*

| | | |
|-------------|-------------------------|---|
| | Rhinanthus | <i>Klappertopf, rhinanthe</i> |
| | Rosaceae | <i>Rosengewächse, rosacées</i> |
| | Obst | <i>Obstform, arbres fruitiers</i> |
| | abortive Rosaceaepollen | <i>Pollen der Rosengewächse, die nicht normal aufgequollen sind, pollens anormals</i> |
| | Sedum | <i>Sedum, orpin</i> |
| | Tilia | <i>Linde, tilleul</i> |
| sans nectar | Aruncus | <i>Geissbart, barbe de bouc</i> |
| | Filipendula | <i>Mädesüss, reine des prés</i> |
| | Hypericum | <i>Johanniskraut, millepertuis</i> |
| | Juncaceae | <i>Binsengewächse, famille des joncs</i> |
| | Plantago | <i>Wegerich, plantain</i> |
| | Poaceae | <i>Gräser, graminée</i> |
| | Quercus | <i>Eiche, chêne</i> |
| | Sambucus | <i>Holunder, surreau</i> |
| | Urtica | <i>Nessel, ortie</i> |

Indicateurs de miellat (algues et spores de champignons): beaucoup

Sans nectars: 10%

Sédiment pauvre en pollens

Contenu de levures: normal

Grains d'amidon: peu

ü.r.** surreprésenté

Le pollen de myosotis et de châtaignier est toujours fortement surreprésenté. C'est pourquoi il peut être exclu de la somme totale lors de l'analyse et du calcul du taux en pour cent (%) des autres plantes à nectar. Les données sont indiquées comme étant corrigées (= k).

u.r.* sousreprésenté

Le pollen de pissenlit est toujours fortement sous-représenté dans le miel. Ceci signifie que la proportion en nectar de pissenlit est plus haute que ce le pourcentage ne le laisse supposer.

Teneur en eau

(Methode: refraktometrisch, SLMB)

15.3 %

Conductance

(Methode: konduktometrisch, SLMB)

1.28 mS/cm

Remarque: les miels possédant une conductance de 0.51 à 0.79 mS/cm sont classés dans la catégorie des miels de fleurs contenant une certaine proportion de miellat (Talpay, B., 1985. Deutsche Lebensmittelrundschau, 5, 81.Jahrgang). Si la conductance est inférieure à 0.51 mS/cm, parle de miels de fleurs. Un miel de forêt présente une conductance d'au moins 0.8 mS/cm.

Analyse sensorielle

(Methode: le gout du miel. Gonnet et Vache 1985)

Aspect: liquide

Couleur: ambre foncé

Odeur: légèrement fruitée, équilibrée, maltée, légèrement présente

Saveur: résineuse, légèrement fruitée, aromatique, épicée, équilibrée, longue en bouche

Appréciation

Selon les analyses effectuées il s'agit d'un miel de miellat.

C'est un miel de sapin.

Commentaire BIP: un miel excellent et équilibré.

L'analyse pollinique des miels de miellat donne uniquement des informations sur l'origine géographique et donne uniquement des indications sur les plantes qui poussent dans la région. La source du miellat est en effet le miellat de feuillus ou de conifères. (Pour les miels de fleurs nous pouvons tirer directement des conclusions sur le nectar récolté). L'analyse des pollens dans les miels de miellat est uniquement indicative. C'est pourquoi nous ne donnons pas de pourcentages quant aux plantes entrant dans sa composition.



Analysen K. Bieri, Kehrsatz